

BULLETIN AGROMÉTÉOROLOGIQUE

Situation météorologique

La décade a été marquée par un retour des activités pluvieuses sur le pays.

Au Nord, si la région de Saint Louis n'a pas reçu de pluies, tel n'a pas été le cas pour les régions de Louga et Matam qui ont enregistré des quantités de précipitations variables entre les périodes du 04, du 07 au 09 juillet. Les cumuls décadaires y ont varié entre 29.8mm à Thilogne et plus de 100mm à Hamady Ounaré dans le département de Kanel.


A l'Ouest (Dakar, Thiès) des pluies d'intensité variable ont été recueillies le 04 et entre les 07 et 08 juillet: 27.0mm à Mbao, 23.0mm à Guédiawaye, 24.6mm à Thiès, 46.0mm à Méouane. Les pluies du 04 juillet ont permis à la station de Thiès de démarrer sa saison culturale.

Le Centre a été mieux arrosé que l'Ouest. En effet, avec l'événement pluvieux du 08 juillet, des précipitations dépassant les 50mm ont été notées dans plusieurs localités des régions de Diourbel et Kafrine : Mbacké (90 mm), Ndame (59.6 mm), Nganda (90.5 mm). Il faut cependant noter que la localité de Bambey n'a enregistré à ce jour que des pluies faibles et présente par conséquent un cumul saisonnier de 5.8 mm.

A l'Est, les activités pluvio orageuses ont été régulières durant toute la décade. En effet les cumuls décadaires ont varié entre 27.0mm à Kédougou et 108.0mm à Saraya.

Au Sud, des pluies modérées à fortes par endroit ont été notées. La plupart des localités situées dans la région de Ziguinchor ont enregistré des cumuls de plus de 100mm sur la période (Bignona, Tendouck, Cabrousse). Au niveau des régions de Sédhiou et Kolda, les cumuls décadaires ont été plus faibles et ont rarement dépassé 50 mm.

A la date du 10 juillet, les cumuls saisonniers sont compris entre 0.4 mm à Saint Louis et 334.6 mm à Kédougou. Comparée à la normale (1991-2020), la situation est globalement excédentaire à normale sur une bonne partie du pays et déficitaire à l'extrême Nord, au Centre-ouest et au Sud-ouest.



Perspectives de la deuxième décade de Juillet 2025

Le week-end du 12 au 13 juillet sera marqué par un temps stable sur le pays à l'exception de la zone Sud où des pluies faibles pourraient être notées.

En revanche, à partir du 14 jusqu'au 16 juillet, des activités pluvio-orageuses intéresseront la quasi-totalité du territoire surtout dans la zone Sud, Est et Centre-sud où des pluies assez fortes sont attendues.

Au delà du 16 juillet jusqu'en fin de décade, le temps sera majoritairement stable sur le pays hormis les régions Sud (de Ziguinchor à Kolda) et Est (Tambacounda, Kédougou) où les perturbations pluvieuses resteront de mise.

Décade du 1er au 10 Juillet 2025

Sommaire

- **Météo:** Retour des activités pluvieuses sur le pays
- **Hydrologie:** Tendance générale à la hausse dans les bassins du fleuve Sénégal et Gambie
- **Agriculture:** Premiers semis au stade plantule dans les régions Centre, Sud et Est du pays
- **Elevage:** Rareté des réserves fourragères dans les départements de Dagana, Podor et Linguère
- **Suivi de la végétation:** l'installation de la végétation se poursuit timidement sur l'ensemble du territoire

Stations	Dates de début de la saison culturale		
	2025	2024	Normale 1991-2020
Saint Louis	-	18 juil.	03 aout
Podor	-	07 juil.	04 aout
Matam	31 mai	19 juin	08 juillet
Ranérrou	31 mai	06 juil.	08 juillet
Louga	-	07 juil.	01 aout
Linguère	28 juin	07 juil.	20 juillet
Diourbel	13 juin	17 juil.	21 juillet
Bambey	-	18 juil.	22 juillet
Thiès	04 juil.	24 juil.	29 juillet
Mbour	10 juil.	18 juil.	28 juillet
Dakar Yoff	-	07 juil.	26 juillet
Fatick	-	07 juil.	13 juillet
Kaolack	13 juin	07 juil.	16 juillet
Kafrine	28 juin	14 juil.	11 juillet
Koungheul	25 juin	06 juil.	12 juillet
Nioro du Rip	08 juil.	11 juil.	09 juillet
Tamba	31 mai	18 juin	29 juin
Goudiry	27 juin	30 juin	03 juillet
Bakel	22 mai	12 juil.	10 juillet
Kédougou	02 mai	13 juin	07 juin
Kolda	08 juin	28 mai	21 juin
Vélingara	30 mai	28 mai	30 juin
Ziguinchor	01 juin	15 juin	25 juin
Cap Skirring	12 juin	18 juin	28 juin

Situation hydrologique

Cette contribution fait le point sur la situation hydrologique de la première décade du mois de Juillet (1 au 10 Juillet 2025). Une comparaison est aussi faite avec la même décade de l'année hydrologique précédente (2024-2025), celles de la plus faible hydraullicité (1984-1985) et de la plus forte hydraullicité (1922-1923) pour les stations du bassin du fleuve Sénégal. La situation n'a pas encore évoluée à la station de Kolda dans le bassin versant de la Casamance. La situation hydrologique au niveau du fleuve Sénégal, sur la décade 01 du mois de juillet est analysée à travers certaines stations suivies par la DGPPE.

Situation hydrologique dans le bassin versant du fleuve Sénégal

Station hydrométrique de Bakel

A la station hydrométrique de Bakel, la situation se présente comme suit: le plan d'eau est passé de 342 cm le 01 Juillet à 519 cm le 10 Juillet. La tendance est à la hausse de 177 cm. Sur la même période, le niveau actuel du fleuve à Bakel est au dessus (151 cm) de son niveau de l'année hydrologique dernière (2024-2025). Comparé à ceux des années hydrologiques de la plus faible hydraullicité, le niveau est largement supérieur de 211 cm en moyenne et de la plus forte hydraullicité, le niveau est largement supérieur de 176 cm en moyenne (Figure 1).




Figure 1 : Evolution du niveau (H en cm) du fleuve Sénégal à la station de Bakel

Station hydrométrique de Matam

A la station hydrométrique de Matam, la situation se présente comme suit: le niveau d'eau est passé de 356 cm le 01 Juillet à 466 cm le 10 Juillet. La tendance est à la hausse de 110 cm. Le niveau actuel du fleuve, à la même période, est supérieur de 143 cm par rapport à celui de l'année hydrologique précédente (2024-2025). Comparé à ceux des années hydrologiques de la plus faible hydraullicité (Figure 2), il est largement supérieur de 258 cm en moyenne, et de la plus forte hydraullicité, ce niveau est largement supérieur de 180 cm en moyenne.




Figure 2 : Evolution du niveau (H en cm) du fleuve Sénégal à la station de Matam

Station hydrométrique de Podor

A la station de Podor, la situation se présente comme suit: le niveau de l'eau est passé de 282 cm le 01 Juillet à 295 cm le 10 Juillet. La tendance est à la hausse de 13 cm. La comparaison du niveau de l'eau de cette année avec celui de l'année passée (2024-2025) sur la même période montre une hausse de 9 cm en moyenne. Comparé à celui à l'année hydrologique de la plus faible hydraullicité (Figure 3), le niveau est largement supérieur de 264 cm en moyenne).




Figure 3 : Evolution du niveau (H en cm) du fleuve Sénégal à la station de Podor

Situation hydrologique dans le bassin versant de la Falémé

Station hydrométrique de Kidira

A la station hydrométrique de Kidira, sur la Falémé, la situation se présente comme suit: le plan d'eau est passé de 84 cm le 01 Juillet à 267 cm le 10 Juillet. La tendance est à la hausse de 183 cm. Sur la même période, le niveau actuel de la Falémé à Kidira est au dessus (229 cm) de son niveau de l'année hydrologique dernière (2024-2025). Comparé à celui de l'année hydrologique de la plus faible hydraullicité, le niveau est inférieur de 112 cm en moyenne (Figure 4).




Figure 4 : Evolution du niveau (H en cm) de la Falémé à la station de Kidira

Situation hydrologique dans le bassin versant du fleuve Gambie

Station hydrométrique de Gouloumbou

A la station hydrométrique de Gouloumbou, sur la Gambie, la situation se présente comme suit: le plan d'eau est passé de 141 cm le 01 Juillet à 171 cm le 10 Juillet. La tendance est à la hausse de 31 cm. Sur la même période, le niveau actuel du fleuve à Gouloumbou est même que celui de l'année hydrologique dernière (2024-2025). Comparé à ceux des années hydrologiques de la plus faible hydraullicité (1983-1984), le niveau est supérieur de 6 cm (Figure 5) et de la plus forte hydraullicité, le niveau est largement inférieur de 135 cm.




Figure 5 : Evolution du niveau (H en cm) du fleuve Gambie à la station de Gouloumbou

Conclusion :

La situation hydrologique dans les bassins des Fleuves Sénégal et Gambie est marquée par une **tendance générale à la hausse**. Cette hausse est plus importante dans le fleuve Sénégal où le **niveau de l'eau est supérieur à celui de l'année hydrologique précédente (2024-2025)**.

Situation agricole

Digitalisation de la distribution des intrants

La phase pilote de la digitalisation des subventions agricoles a été lancée dans deux départements : Tivaouane et Nioro.

Elle repose sur l'enrôlement des producteurs via tablette, l'édition de lettres de voitures électroniques, et le suivi numérique des cessions.

Résultats obtenus :

- 41 210 producteurs enrôlés ;
- 164 acteurs formés (agents MASAE, commissions, opérateurs) ;

- 142 lettres de voiture digitalisées ;

- 59 opérateurs enregistrés ;

- Système d'alerte intégré et comités de réclamation installés.

Ce système marque une rupture avec les pratiques manuelles passées. Il vise une généralisation progressive à partir de la prochaine campagne, avec des adaptations selon les réalités régionales.

A Kaffrine : Mil souna : stade développement foliaire pour les premiers semis à sec et plantule pour les secondes vagues de semis ; épandage de

Situation agricole (suite)

15-10-10 en fumure de fond.

Sorgho : stade plantule pour les premiers semis ; épandage de 15-10-10 en fumure de fond.

Maïs : stade plantule pour le maïs de case et levée-germination pour les champs de brousse ; épandage de 15-15-15 en fumure de fond.

Arachide : stade premières feuilles pour les premiers semis et levée-germination pour les secondes vagues de semis ; « radou » ; épandage de 6-20-10 en fumure de fond.

A Kolda : la première vague de semis du mil sounas au stade de 2-6 feuilles, l'arachide est au stade de 6 feuilles, le maïs est à 5 feuilles. La deuxième vague de mil est au stade plantule, l'arachide et le maïs sont en levées.

La troisième vague de semis du mil souna est au stade de levée et germination pour l'arachide et le maïs.

A Tambacounda : Les semis ont débuté dans quelques localités de la région avec les pluies du 12 & 13 juin 2025.

Situation pastorale

La Situation alimentaire, l'état du cheptel et des pâturages

Les réserves fourragères dans les départements de Dagana, Podor et Linguère sont de plus en plus rares. La paille de riz issue de la récolte de la contre saison est fortement convoitée par les animaux dans cette zone. Par contre les départements de Matam, Kanel et Ranérou, Les pâturages sont constitués d'un mélange de jeunes pousses d'herbes et de paille de brousse dont la qualité et la quantité ont beaucoup diminué.

S'agissant des mouvements du bétail, les transhumants continuent d'affluer dans le Centre et le Sud du pays à la recherche de meilleures conditions de pâturages. Des mouvements internes ont été notés dans la région de Louga en particulier de Dahra Thiamène vers le Ranch de Dolly qui est une zone d'accueil importante avec un site pastoral aménagé. Des mouvements interrégionaux ont également été rapportés de Kaffrine (Ndioum Gainthe) vers Tambacounda (Pass Kotto). Les mêmes mouvements interrégionaux ont été signalés de Matam (Bondji) vers Tambacounda. Ces mouvements sont dictés par la recherche de poches de pâturages disponibles par endroit.

Abreuvement du bétail

L'abreuvement du cheptel se fait principalement au niveau des forages, des puits pastoraux et au niveau du fleuve Sénégal et de ses défluent dans le Walo.

Situation Zoosanitaire


Durant la période du 30 juin au 06 juillet 2025, dans le cadre du Système national de Surveillance épidémiologique des maladies animales et au titre de la surveillance passive, les quatorze (14) Directeurs régionaux de l'Elevage ont rapporté des suspicions de : botulisme bovin, équin et ovin ; bronchite infectieuse aviaire, bovine et ovine ; charbon symptomatique bovin ; clavelée et variole caprine et aviaire ; coccidiose aviaire et bovine ; coryza infectieux aviaire ; dermatophilose bovine et équine ; dermatose équine ; dermatose nodulaire contagieuse bovine ; dermatose prurigineuse canine ; distomatose bovine et ovine ; ecthyma contagieux ovin et caprin ; eczéma chez les caprins ; entérotaxémie ovine ; fasciolose bovine ; fièvre aphteuse bovine et ovine ; fièvre de la vallée du Rift chez les ovins ;

gale sarcoptique ovine ; gourme équine ; habronémose cutanée équine ; leishmaniose canine ; lymphangite épizootique équine ; maladie de Gumboro ; maladie de Marek ; maladie de Newcastle ; maladie respiratoire contagieuse chez la volaille ; myiases canine et ovine ; parvovirose canine ; pasteurellose bovine, ovine et caprine ; péripneumonie contagieuse bovine ; peste des petits ruminants ; pleuropneumonie ovine et caprine ; rage canine, asine et simiesque (primate) et humaine ; salmonellose aviaire ; tétanos équin et ovin ; théliériose bovine ; trypanosomose asine, bovine, équine et ovine.

Au total, deux cent vingt-trois (223) suspicions de foyers de maladies ont été rapportés. Les cinq (05) pathologies dominantes sont les suivantes :


la pasteurellose bovine, ovine et caprine pour 32 foyers ;
la clavelée et variole caprine et aviaire pour 27 foyers ;
la peste des petits ruminants pour 21 foyers ;
la gourme équine pour 18 foyers ;
le botulisme bovin, équin et ovin pour 15 foyers.

Pour contrôler les foyers de maladies, l'isolement, le traitement des malades, la saisie et la dénaturation d'organes impropres à la consommation humaine, la vaccination pérfocale et la sensibilisation des éleveurs ont été effectués. La figure ci-dessous indique la répartition des foyers par région durant la semaine du 30 juin au 06 juillet 2025



Suivi de la végétation

Indice de Végétation (NDVI : Normalized Difference Vegetation Index)



Cartes du NDVI de [a] la deuxième décade, [b] la troisième décade, du mois de juin et [c] la première décade du mois de juillet 2025 en comparaison avec les valeurs de l'année 2024 aux mêmes décades (d), [e] et [f], respectivement.

A la première décade du mois de juillet 2025, l'installation de la végétation se poursuit timidement sur l'ensemble du territoire à l'exception de la partie sud et sud-est qui présente des valeurs du NDVI moyennes (Figures a, b et c). Cependant, ces valeurs sont plus élevées que celles de l'année précédente à la même période (Figure d, e et f). Cette situation pourrait être expliquée par la quantité de pluie reçue durant la décade précédente (ANACIM, 2025).

Recommandations

- Inciter les producteurs à s'informer sur l'information climatique et météorologique avant de procéder à l'épandage d'engrais;
- L'ANACIM devrait communiquer d'avantage sur les prévisions de fin de saison afin de mieux recadrer les fenêtres de semis;
- Les mises en place des semences d'espèces diverses devraient être accélérées dans les régions centre du pays;
- Les organisations paysannes et les coopératives doivent s'approprier des programmes spéciaux de fertilisation (chaulage et phosphatage);
- Alerter la DPV via la base centrale ou les bases déconcentrées, pour toute observation de ravageurs dans sur champ et pour une prise en charge rapide et efficace.

Groupe de Travail Pluridisciplinaire

Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie
Aéroport Léopold S. Senghor B.P. 8257 Dakar-Yoff _ Sénégal
Téléphone : +221 33 869 53 39 Fax : +221 33 820 13 27

Crée dans le cadre du Programme AGRHYMET, le GTP a pour objectif de contribuer à l'alerte précoce pour la sécurité alimentaire en fournissant des informations complètes sur la campagne agricole. Sa coordination technique est assurée par l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) . Le groupe composé des services intervenant dans le domaine de la production agricole(Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau, Direction de l'Agriculture, Direction de la Protection des Végétaux, Direction de l'Elevage, Centre de Suivi Ecologique, Commissariat à la Sécurité Alimentaire, Secrétariat Exécutif du Conseil National de la Sécurité Alimentaire, CONACILSS, Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques...) publie à la fin de chaque décade un Bulletin Agrométéorologique Décadaire destiné aux autorités nationales, aux bailleurs de fond et aux techniciens, à la presse etc.