

BULLETIN AGROMÉTÉOROLOGIQUE

Situation météorologique

Situation pluviométrique

Malgré l'arrivée précoce des premières pluies au niveau de quelques localités Centre, Nord-est et Sud-est du pays, le rythme des activités pluvio orageuses est demeuré timide au cours de cette décade.

Au Nord, les événements pluvieux ont été notés en début de décade et ont été plus marqués dans la région de Matam avec 29.2mm à Ranérou, 19.0mm à Matam, 16.2mm à Kanel. Des pluies faibles, ont été notées dans les régions de Saint Louis et Louga même si on a noté 6.0mm à Podor, 12.6mm à Linguère, 4.5mm à Déaly et 2.0mm à Louga.



Au Centre-ouest, plusieurs localités ont enregistré leurs premières pluies durant la journée du 13 juin. Ces pluies ont été mal réparties dans l'espace, surtout dans la région Dakaroise où une forte disparité a été notée entre la partie Nord (la banlieue : Mbao, Rufisque) où des quantités de pluies variant entre 20 et 16 mm ont été reçues et le Sud (la station de Dakar Yoff) qui n'a enregistré aucune pluie.

Dans le Centre-sud (régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine), les précipitations notées les 11 et 13 juin sont venues renforcer celles déjà enregistrées les 31 mai et 1 juin. Mais depuis le 14 juin une pause s'est installée jusqu'en fin de période.

Au niveau des régions de Tambacounda et Kédougou une bonne dynamique des activités pluvio orageuses est maintenue sur toute la décade. En effet les cumuls ont varié entre 4.5mm à Kidira et plus de 100.0mm à Fongolimbi.

AU Sud, de faibles pluies ont été recueillies les 12 et 17 juin. Les localités de Diouloulou et Bounkiling n'ont enregistré aucune pluie durant la décade. Les cumuls décennaires ont généralement été inférieurs à 20 mm à l'exception de Vélingara (31.7 mm), Sédhiou (22.5 mm) et Cap Skirring (20.2).

Le cumul saisonnier varie entre 0.4 mm à Saint Louis et 265.2mm à Kédougou (voir carte de cumul saisonnier au 20 juin). Comparée à la normale 1991-2020, la situation est déficitaire à l'extrême Nord et Ouest, la partie Sud Ouest, cependant elle est excédentaire à normale sur le reste du pays



Perspectives de la troisième décade de Juin 2025

Du 25 au 26 juin, des activités pluvieuses faibles à localement modérées sont attendues dans la zone Sud du pays.

Dans la nuit du 27 allant au 29 juin, des orages et pluies d'intensités variables seront notés sur une partie du territoire notamment dans les régions du Sud (de Ziguinchor à Kédougou), de l'Est (Tambacounda, Matam), du Centre (Kaffrine, Kaolack, Fatick,) avec des extensions attendues sur Diourbel, Thiès et Dakar. Toutefois, les probabilités sont très faibles dans la zone Nord où de faibles pluies pourraient y être notées.

En revanche, globalement les quantités de pluies seront moindres du 30 juin au 01 juillet. Toutefois, celles-ci connaîtront une augmentation du 02 au 05 juillet atteignant ainsi plusieurs localités du Centre et de l'Est.

Décade du 11 au 20 Juin 2025

Sommaire

- Météo:** Activités pluvieuses timides au cours de cette décade
- Hydrologie:** Début timide des écoulements sur les cours d'eau
- Agriculture:** Généralisation des semis du mil
- Protection des végétaux:** Présence d'oiseaux granivores et de cercosporiose
- Elevage:** Rarefaction des pâturages dans le Nord
- Suivi de la végétation:** Installation timide de la végétation au Sud.

Stations	Dates de début de la saison culturale		
	2025	2024	Normale 1991-2020
Saint Louis	-	18 juil	03 aout
Podor	-	07 juil	04 aout
Matam	31 mai	19 juin	08 juillet
Ranérou	31 mai	06 juil	08 juillet
Louga	-	07 juil	01 aout
Linguère	-	07 juil	20 juillet
Diourbel	13 juin	17 juil	21 juillet
Bambey	-	18 juil	22 juillet
Thiès	-	24 juil	29 juillet
Mbour	-	18 juil	28 juillet
Dakar Yoff	-	07 juil	26 juillet
Fatick	-	07 juil	13 juillet
Kaolack	13 juin	07 juil	16 juillet
Kaffrine	-	14 juil	11 juillet
Koungheul	-	06 juil	12 juillet
Nioro du Rip	-	11 juil	09 juillet
Tambacounda	31 mai	18 juin	29 juin
Goudiry	-	30 juin	03 juillet
Bakel	22 mai	12 juil	10 juillet
Kédougou	02 mai	13 juin	07 juin
Kolda	08 juin	28 mai	21 juin
Vélingara	30 mai	28 mai	30 juin
Ziguinchor	01 juin	15 juin	25 juin
Cap Skirring	12 juin	18 juin	28 juin

Situation hydrologique

Situation hydrologique dans le bassin versant du fleuve Sénégal

Station hydrométrique de Bakel

A la station hydrométrique de Bakel, la situation se présente comme suit: le plan d'eau est passé de 264 cm le 10 à 280 cm le 19 Juin. La tendance est à la hausse de 16 cm. Sur la même période, le niveau actuel du fleuve à Bakel est au-dessus (30 cm) de son niveau de l'année hydrologique dernière (2024-2025). Comparé aux années hydrologiques de la plus faible hydraulicité, le niveau est largement supérieur de 220 cm en moyenne (Figure 1).




Figure 1 : Evolution du niveau (H en cm) du fleuve Sénégal à la station de Bakel

Station hydrométrique de Matam

A la station hydrométrique de Matam, la situation se présente comme suit: le niveau d'eau est passé de 219 cm le 10 Juin à 225 cm le 19 Juin. La tendance est à la hausse de 06 cm. Le niveau actuel du fleuve, à la même période, est supérieur de 45 cm par rapport à celui de l'année hydrologique précédente (2024-2025). Comparé aux années hydrologiques de la plus faible hydraulicité (1983-1984), il est supérieur de 247 cm en moyenne.




Figure 2 : Evolution du niveau (H en cm) du fleuve Sénégal à la station de Matam

Station hydrométrique de Podor

A la première décade de juin, la situation se présente comme suit: le niveau de l'eau est passé de 279 cm le 10 juin à 272 cm le 19 Juin. La tendance est à la baisse de 07 cm. La comparaison du niveau de l'eau de

cette année avec celui de l'année passée (2024-2025) sur la même période montre une baisse de 1 cm en moyenne. Par rapport aux années de faible hydraulicité (Figure 3), le niveau de cette année est supérieur de 294 cm en moyenne).




Figure 3 : Evolution du niveau (H en cm) du fleuve Sénégal à la station de Podor

Station hydrométrique de Gouloumbou

A la station hydrométrique de Gouloumbou, la situation se présente comme suit: le plan d'eau est passé de 140 cm le 10 Juin à 137 cm le 19 Juin. La tendance est à la baisse de 3 cm. Sur la même période, le niveau actuel du fleuve à Gouloumbou est supérieur de 5 cm en moyenne que son niveau de l'année hydrologique dernière (2024-2025). Comparé à l'année hydrologique de la plus faible hydraulicité (1983-1984), le niveau est largement inférieur de 7 cm (Figure 4).




Figure 4 : Evolution du niveau (H en cm) du fleuve Gambie à la station de Gouloumbou

Conclusion :

La situation hydrologique dans les bassins des Fleuve Sénégal et Gambie est marquée par deux tendances différentes : une tendance à la hausse dans le fleuve du Sénégal, malgré la baisse à la station de Podor et une baisse dans celui de la Gambie.

Situation agricole

Le démarrage des préparatifs de la campagne agricole 2025-2026 est effectif dans toutes les régions depuis mi-avril avec la mise en place des Comités de Supervision, de Contrôle et de Suivi des Opérations de mise en place et de Cession des Intrants agricoles et Matériels agricoles.

A la première décade du mois de juin, les activités agricoles restent dominées dans l'ensemble par les travaux pré-hivernage de défrichage, de nettoyage et de brûlis des champs, le décorticage des coques d'arachide, l'égrenage des épis de maïs, la poursuite des mises en place et des cessions des intrants (semences, engrais) et du matériel agricole. La généralisation des semis du mil est notée.

Les innovations majeures de la campagne 2025/2026

Bulk Procurement Program (BPP)

Le Bulk Procurement Program (BPP) constitue une réforme de grande envergure mise en œuvre pour la première fois à grande échelle durant cette campagne. Ce mécanisme d'achat groupé permet au MASAE, avec l'appui du ministère des finances, d'engager des négociations directes avec les fournis-


seurs à l'échelle internationale, aboutissant à des économies substantielles estimées à près de 2 milliards FCFA sur l'urée.

Les principaux résultats obtenus sont :

- Une commande globale de 73 000 tonnes d'urée, pour un besoin estimé à 60 000 tonnes ;
- Déjà 33 000 tonnes réceptionnées au Port Autonome de Dakar ;
- 15 000 tonnes disponibles dans les magasins régionaux ;
- 25 000 tonnes en cours d'acheminement ;
- Réduction du prix d'achat moyen à l'importation ;

Le BPP a été mis en œuvre dans une logique de solidarité nationale, avec des répartitions de quotas entre fournisseurs nationaux et étrangers, tout en assurant une livraison équitable et à temps dans toutes les zones agro écologiques. Le Port Autonome de Dakar, par la voix de son DG, a salué cette coopération logistique historique.

Situation agricole (suite)



Semences

Arachide : le taux de mise en place atteint 72 %, avec un taux de cession de 50 %, traduisant une bonne dynamique sur le terrain mais nécessitant une accélération dans les opérations de distribution locale.

Engrais

NPK 6-20-10 : taux de mise en place de 48 %, mais une cession encore faible estimée à 10 % ;

NPK 15-10-10 : mise en place de 30 %, avec seulement 2 % de cession ;

NPK 15-15-15 : taux de mise en place de 38 %, avec 8 % de cession effective.

Urée

La mise en place de l'urée est en cours, dans le cadre du Bulk Procurement Program (BPP). Plus de 48 000 tonnes sont déjà mobilisées sur un besoin total estimé à 60 000 tonnes. Les livraisons sont en phase active via le port de Dakar et les plateformes régionales.

Situation des cultures

La région de Kédougou a enregistré les premières vagues de semis qui sont aux stades levés pour l'arachide et plantules pour le coton, le maïs et le sorgho.

CULTURES	SEMIS			ETAT DES CULTURES		OBSERVATIONS
	époque	Caractère (sec ou humide)	Vague	Stade phénologique	Entretien des cultures	
Arachide	2 ^{ème} décade Juin	Humide	1 ^{ère}	Levée		RAS
Maïs	2 ^{ème} décade Juin	Humide	1 ^{ère}	Plantule		RAS
Sorgho	2 ^{ème} décade Juin	Humide	1 ^{ère}	Plantule		RAS
Coton	1 ^{er} décade Juin	Humide	1 ^{ère}	Plantule	Épandage NPK	RAS

A Kolda, le semis à sec du mil Souna a démarré dans la région suite aux premières pluies enregistrées les 30 et 31 mai dans les communes de Dinguiraye, de Bourouco et de Kéréwane.

A Kaolack, les semis à sec du mil, entamés dans la deuxième décade du mois de mai, sont en cours dans la première décade du mois de juin. Il y a un risque d'avortement à cause des premières pluies enregistrées, le 01 juin 2025.

A Kaffrine, le semis à sec du Mil souna se poursuit dans les champs.

Situation phytosanitaire

Au cours de cette décade, les activités de surveillance phytosanitaire ont été intensifiées dans les zones rizicoles du Département de Kanel et dans les champs de banane à Vélingara.

A Kanel, région de Matam, les prospections ont principalement ciblé les oiseaux granivores, en raison de la sensibilité des cultures de riz aux stades d'épiaison et de maturation. Des traitements ont été effectués sur **dortoir et au niveau du couloir de passage des oiseaux**.

A Vélingara, région de Kolda, la cercosporiose sur banane a été détectée et les analyses effectuées au laboratoire de phytopathologie de la DPV ont confirmé cette maladie redoutable. Ainsi des traitements ont été faits à l'aide de drone.

I/LES OISEAUX GRANIVORES

Les prospections menées dans le département de Kanel ont permis de détecter la présence de *Quelea quelea* et de *Passer luteus* adultes dans les localités de **Waoundé**, de **Ganguel Soulèye** et de **Collengal** où les cultures de riz étaient aux stades critiques d'épiaison, laiteux, maturation et début de récolte. Au total 50 litres de Fethion ont été utilisés sur dortoir et sur couloir de passage des oiseaux.

II/LA CERCOSPORIOSE SUR BANANE

Des missions de terrain effectuées dans le **Département de Vélingara** à **Afia**, **Kourmbambe**, **Thiankoung**, **Wassadou**, **Pakour** ont permis de détecter, d'analyser et de confirmer au labo de phytopathologie de la DPV cette maladie fongique redoutable causée par un champignon du genre **Mycosphaerella**. Au total 530 ha ont été traités par avec de l'**AZOX** à la dose de 1 litre à l'hectare soit 530 litres utilisés



Drone chargé pour traitement phytosanitaire

Situation pastorale

La Situation alimentaire, l'état du cheptel et des pâturages

La situation alimentaire est assez préoccupante dans le nord avec une raréfaction du pâturage. Seules les zones du ranch Djibo Leyti Ka, la réserve de faune du nord de Ferlo et une partie du département de Kanel ont une disponibilité en pâturage. Par conséquent, il est noté une forte concentration du cheptel local et des départements voisins. Les éleveurs ne comptent que sur les réserves fourragères dans les mis en défens et le pâturage aérien pour alimenter le bétail. Par contre on note dans les départements de Tamba, Bakel, Ranérou et Matam la végétation s'installe timidement.



Photo

tos pris le 16/06/2025 entre Dendoundy et Ranerou Ferlo

La complémentation est constituée en majorité d'aliments usinés et des sous-produits (son de blé, tourteau de coton...) qui sont disponibles sur le marché, mais peu accessibles à tout le monde du fait de la cherté des prix. Cette situation pourrait s'aggraver en cette veille de l'hivernage avec le défrichement des champs qui va accentuer le déficit de pâturage.

Abreuvement du bétail

L'abreuvement du cheptel se fait principalement au niveau des forages puits pastoraux et au niveau du fleuve Sénégal et de ses défluent dans le

Walo. Le niveau de remplissage des mares est très faible ne pouvant pas abreuver le bétail.


Situation zoonositaire

Au total, cent six (106) suspicions de foyers de maladies ont été rapportés. Les cinq (05) pathologies dominantes sont les suivantes :

- la pasteurellose bovine, ovine et caprine pour 11 foyers ;
- la peste des petits ruminants pour 10 foyers ;
- la clavelée et variole caprine pour 9 foyers ;
- la gourme chez les espèces équine et asine pour 8 foyers ;
- la distomatose bovine, ovine et caprine pour 7 foyers ;
- la trypanosomose asine, bovine et ovine pour 7 foyers.







Pour contrôler les foyers de maladies, l'isolement, le traitement des malades, la saisie et la dénaturation d'organes impropres à la consommation humaine, la vaccination pérfocale et la sensibilisation des éleveurs ont été effectués.

La figure ci-dessous indique la répartition des foyers par département durant la semaine du 09 au 15 juin 2025.



Suivi de la végétation

A la deuxième décade du mois de juin 2025, l'installation de la végétation reste timide sur l'ensemble du territoire national notamment dans la partie sud du pays avec des valeurs du NDVI qui sont faibles à moyennes (Figures a, b et c). Cependant, ces valeurs restent relativement plus élevées que celles de l'année précédente. Cette situation pourrait être expliquée par un démarrage plus précoce de la saison cette année dans cette zone (Figures d, e et f).



Cartes du NDVI de (a) la troisième décade du mois de mai, (b) la première décade et (c) la deuxième décade du mois de juin 2025 en comparaison avec les valeurs de l'année 2024 aux mêmes décades (d), (e) et (f), respectivement.

Recommandations générales

- Encourager les populations à s'informer sur les prévisions météorologiques : pour apprécier les dates de semis optimales en humide au niveau des localités ayant reçues des pluies utiles;
- *Faire une surveillance* accrue des oiseaux granivores et mener une coordination communautaire avec les équipes de la DPV pour limiter l'accès de ces oiseaux dans les zones rizicoles surtout aux stades sensibles ;
- Pour endiguer la propagation de la cercosporiose sur les bananeraies dans le département de Vélingara, il faut éliminer régulièrement les feuilles infectées et les enterrer, maintenir un bon espacement entre les plants, éviter les excès d'azote dans la fertilisation, qui favorisent un feuillage dense propice au développement de la maladie, éviter l'humidité prolongée qui favorise la germination des spores, utiliser des variétés tolérantes et/ ou résistantes.
- Accélérer la mise en place des espèces diverses dans les régions Centre et Sud.
- Procéder au déparasitage et à la vaccination du cheptel contre les entérotoxémies

Groupe de Travail Pluridisciplinaire

Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie
Aéroport Léopold S. Senghor B.P. 8257 Dakar-Yoff _ Sénégal
Téléphone : +221 33 869 53 39 Fax : +221 33 820 13 27
Messagerie : gtp-senegal_dmn@yahoo.fr

Crée dans le cadre du Programme AGRHYMET, le GTP a pour objectif de contribuer à l'alerte précoce pour la sécurité alimentaire en fournissant des informations complètes sur la campagne agricole. Sa coordination technique est assurée par l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) . Le groupe composé des services intervenant dans le domaine de la production agricole(Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau, Direction de l'Agriculture, Direction de la Protection des Végétaux, Elevage, Centre de Suivi Ecologique, Commissariat à la Sécurité Alimentaire, Secrétariat Exécutif du Conseil National de la Sécurité Alimentaire, CONACILSS, Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques...) publie à la fin de chaque décade un Bulletin Agro-météorologique Décadaire destiné aux autorités nationales, aux bailleurs de fond et aux techniciens, à la presse etc.