

BULLETIN AGROMÉTÉOROLOGIQUE

Situation météorologique

Situation pluviométrique

Cette décade n'a pas été très pluvieuse sur l'ensemble du pays.

Au Nord, après une accalmie de 15 jours, les pluies ont repris durant la journée du 28 juin. Des quantités journalières comprises entre 20 et 50 mm ont été notées sur l'axe Linguère-Ranéro, tandis que la région de Saint Louis n'a pas été arrosée.


A l'Ouest, au niveau des régions de Dakar et de Thiès, de très faibles pluies ont été reçues le 28 juin. Ces quantités inférieures à 10 mm ne sont pas suffisantes pour permettre de procéder à des semis en humide.

Au Centre, les régions de Diourbel et Fatick ont enregistré des pluies faibles durant la seule journée du 28 juin. Les pluies ont varié entre 16.1mm à Taïf et 1.3 mm à Bambey. Quant aux régions de Kaolack et Kaffrine les pluies du 25 et 28 (supérieures à 20.0 mm) ont permis le démarrage de la saison notamment à Kaffrine, Malem Hodar et Kounghoul.

L'Est (Tamba et Kédougou) a été régulièrement arrosé, les cumuls décennaux ont varié entre 112.0mm à Salémata et 7.7mm à Tambacounda.

Au Sud du pays (Kolda, Sédhiou, Ziguinchor), les quantités reçues sont relativement importantes et bien réparties sur toute la décade. En effet la plupart des cumuls décennaux ont dépassé 50.0mm.

Le cumul saisonnier varie entre 307.7mm à Kédougou et 3.3mm à Thilogne. La situation est déficitaire à l'extrême Nord, à l'Ouest et au Sud Ouest elle est excédentaire à normale sur le reste du pays.



Perspectives pour la première décade de Juillet 2025

Du 04 au 05 juillet 2025, des pluies d'intensités variables intéresseront tout le pays.

En effet, des orages et pluies modérées, devenant localement fortes, sont attendues sur le Sud, le Centre et l'Est du pays. Elles évolueront ensuite vers le Nord et les régions côtières (Dakar y compris) avec une intensité faible à modérée.

Une très courte accalmie pluviométrique sera notée sur les zones Nord, Est et Centre le dimanche 06 juillet.

Du 07 au 09 juillet, les pluies reprendront progressivement sur l'ensemble du territoire excepté Saint-Louis avec une intensité beaucoup moins marquée que celle des pluies prévues en début de décade.

Décade du 21 au 30 Juin 2025

Sommaire

- Météo:** Décade peu pluvieuse sur le pays
- Hydrologie:** Tendances généralement à la hausse dans le fleuve du Sénégal et à la baisse sur le fleuve Gambie
- Agriculture:** Mise en place des intrants très avancée dans les localités Centre et Sud du pays
- Situation phytosanitaire:** Calme dans l'ensemble
- Situation pastorale:** Rareté des pâturages dans le Nord du pays
- Suivi de la végétation:** Installation timide de la végétation dans le Sud.

Stations	Dates de début de la saison culturale		
	2025	2024	Normale 1991-2020
Saint Louis	-	18 juil	03 aout
Podor	-	07 juil	04 aout
Matam	31 mai	19 juin	08 juillet
Ranéro	31 mai	06 juil	08 juillet
Louga	-	07 juil	01 aout
Linguère	-	07 juil	20 juillet
Diourbel	13 juin	17 juil	21 juillet
Bambey	-	18 juil	22 juillet
Thiès	-	24 juil	29 juillet
Mbour	-	18 juil	28 juillet
Dakar Yoff	-	07 juil	26 juillet
Fatick	-	07 juil	13 juillet
Kaolack	13 juin	07 juil	16 juillet
Kaffrine	28 juin	14 juil	11 juillet
Kounghoul	25 juin	06 juil	12 juillet
Nioro du Rip	-	11 juil	09 juillet
Tambacounda	31 mai	18 juin	29 juin
Goudiry	-	30 juin	03 juillet
Bakel	22 mai	12 juil	10 juillet
Kédougou	02 mai	13 juin	07 juin
Kolda	08 juin	28 mai	21 juin
Vélingara	30 mai	28 mai	30 juin
Ziguinchor	01 juin	15 juin	25 juin
Cap Skirring	12 juin	18 juin	28 juin

Situation hydrologique

Situation hydrologique dans le bassin versant du fleuve Sénégal

Station hydrométrique de Bakel

A la station hydrométrique de Bakel, la situation se présente comme suit: le plan d'eau est passé de 272 cm le 21 Juin à 284 cm le 30 Juin. La tendance est à la hausse de 112 cm. Sur la même période, le niveau actuel du fleuve à Bakel est au-dessus (54 cm) de son niveau de l'année hydrologique dernière (2024-2025). Comparé à ceux des années hydrologiques de la plus faible hydraulicité, le niveau est largement supérieur de 169 cm en moyenne et de la plus forte hydraulicité, le niveau est largement supérieur de 189 cm en moyenne (Figure 1).




Figure 1 : Evolution du niveau (H en cm) du fleuve Sénégal à la station de Bakel

Station hydrométrique de Matam

A la station hydrométrique de Matam, la situation se présente comme suit: le niveau d'eau est passé de 227 cm le 21 Juin à 309 cm le 30 Juin. La tendance est à la hausse de 82 cm. Le niveau actuel du fleuve, à la même période, est supérieur de 18 cm par rapport à celui de l'année hydrologique précédente (2024-2025). Comparé à celui à l'année hydrologique de la plus faible hydraulicité (Figure 2), il est supérieur de 215 cm en moyenne.




Figure 2 : Evolution du niveau (H en cm) du fleuve Sénégal à la station de Matam

Station hydrométrique de Podor

A la station de Podor, la situation se présente comme suit: le niveau de l'eau est passé de 277 cm le 21 juin à 280 cm le 30 Juin. La tendance est à la baisse de 03 cm. La comparaison du niveau de l'eau de cette année avec celui de l'année passée (2024-2025) sur la même période montre une hausse de 6 cm en moyenne. Comparé à celui à l'année hydrologique de la plus faible hydraulicité (Figure 3), le niveau est supérieur de

272 cm en moyenne).




Figure 3 : Evolution du niveau (H en cm) du fleuve Sénégal à la station de Podor

Station hydrométrique de Kidira

A la station hydrométrique de Kidira, sur la Falémé, la situation se présente comme suit: le plan d'eau est passé de 0 cm le 21 Juin à 117 cm le 30 Juin. La tendance est à la hausse de 117 cm. Sur la même période, le niveau actuel du fleuve à Kidira est au-dessus (61 cm) de son niveau de l'année hydrologique dernière (2024-2025). Comparé à celui de l'année hydrologique de la plus faible hydraulicité, le niveau est inférieur de 87 cm en moyenne (Figure 4).

Situation hydrologique dans le bassin versant du fleuve Gambie

Station hydrométrique de Gouloumbou

A la station hydrométrique de Gouloumbou, la situation se présente comme suit: le plan d'eau est passé de 140 cm le 10 Juin à 137 cm le 19 Juin. La tendance est à la baisse de 3 cm. Sur la même période, le niveau actuel du fleuve à Gouloumbou est supérieur de 5 cm en moyenne que son niveau de l'année hydrologique dernière (2024-2025). Comparé à l'année hydrologique de la plus faible hydraulicité (1983-1984), le niveau est largement inférieur de 7 cm (Figure 4).




Figure 4 : Evolution du niveau (H en cm) du fleuve Gambie à la station de Gouloumbou

Conclusion :

La situation hydrologique dans les bassins des Fleuve Sénégal et Gambie est marquée par deux tendances différentes : une tendance à la hausse dans le fleuve du Sénégal, malgré la baisse à la station de Podor et une baisse dans celui de la Gambie.

Situation agricole

Progression des volumes chargés au niveau des ICS (au 22 juin)

Cette évolution reflète l'effet structurant, qui a permis une planification plus rigoureuse, une mutualisation efficace des ressources logistiques, et une meilleure coordination entre les différents maillons de la chaîne d'approvisionnement. Elle illustre également l'engagement du Gouvernement à sécuriser l'accès aux intrants stratégiques dès les premières phases de la campagne agricole.

Analyse de l'évolution des prix de cession des engrais NPK (2023-2025)

Les prix de cession des principales formules d'engrais ont connu une tendance globalement baissière entre 2023 et 2025. Cette évolution est le fruit de réformes importantes dans la politique d'approvisionnement, notamment par la mise en œuvre du BPP,

les négociations avec les fournisseurs, ainsi que la rationalisation des subventions publiques.

La baisse des prix de cession est particulièrement significative pour les formules les plus utilisées dans les cultures vivrières et industrielles, ce qui aura pour effet :

- D'alléger le coût de production pour les producteurs, en particulier les petits exploitants ;
- D'encourager l'augmentation des emblavures, avec des intrants plus abordables ;
- De renforcer la compétitivité du secteur agricole sénégalais dans un contexte de montée des prix mondiaux

A Fatick. Les mises en place sont très avancées et portent sur **85 %** du quota régional. Le niveau de cession est de **68%**.

Situation agricole (suite)

Les producteurs ont pratiqué, à leur grande majorité le semis en sec pour le mil. On estime pour le moment que 90 % des emblavures de mil sont semées en sec au niveau de la région. A Tambacounda: Globalement, le taux moyen de la mise en place des semences d'arachide est de 91,0 % contre 52 % l'année dernière à la même période. Le taux moyen de la cession des semences d'arachide est de 92,3 % contre 41 % l'année dernière à la même période. Les semis ont débuté dans quelques localités de la région avec les pluies du 12 & 13 juin 2025. A Kolda, Les mises en place de semences d'arachide sont en cours dans la région avec 4 691,7 tonnes sur une prévision de 5 115 tonnes soit un taux de 92 % et les cessions sont de 4 205,55 tonnes soit un taux de 89,6 %.	La première vague de semis de l'arachide est au stade de levée. A Kaffrine : Sur le plan pluviométrique, l'hivernage ne s'est pas encore installé au niveau régional. Par contre, les opérations de mise en place et de cession des intrants agricoles subventionnés ont démarré à partir du 26 mai 2025 sur l'ensemble du territoire régional. A la date du 26 juin, la situation se présente comme suit au niveau régional : - <u>Semences Arachides:</u> 13 463,35 T reçues sur un quota de 16 580T soit un taux de mise en place de 81,20 % et 12 368,54 T déjà vendues soit un taux de cession de 91,87 %. -<u>Amendement organique solide:</u> Quotas prévisionnels de 204 T pour Coopérative semencière de Kahi, de 269 T pour celle de Kathiote et de 203 T avec Diocoul M'Belbouck dans le département de Kaffrine.
---	---

Situation phytosanitaire

Durant cette décade, les activités de prospection se sont poursuivies dans les zones rizicoles du nord et dans la zone centre du pays. Deux principaux ravageurs ont été identifiés ; les oiseaux granivores, notamment Passer luteus, dans le département de Kanel, Région de Matam et les sauteriaux (<i>Oedaleus senegalensis</i>) dans le département de Kaffrine, Région de Kaffrine. I/LES OISEAUX GRANIVORES Les prospections menées dans le Département de Kanel ont permis de détecter la présence de Passer luteus adultes au niveau de la localité de Ganguel Soulèye où les cultures de riz étaient aux stades, laiteux, matura-	tion. Aucun dortoir identifié aux alentours mais la surveillance est de mise. II/LES SAUTERIAUX Les prospections effectuées dans le Département de Kaffrine à Hamdallaye-Kanouma, à Mboyène, à Ndakhar Mbayène ont confirmé la présence sauteriaux du genre <i>Oedaleus senegalensis</i> sur Mil et Sorgho au stade levée. Au total 50 hectares sont infestés et des traitements phytosanitaires sont envisagés dans les meilleurs délais.
--	--


Situation pastorale

La Situation alimentaire, l'état du cheptel et des pâturages La rareté du pâturage est toujours d'actualité dans les régions du Nord, toutefois, on note le reverdissement du tapis herbacé dans certaines localités avec les faibles pluies enregistrées ces derniers jours. Dans le Diéri, ces jeunes pousses sont exploitées par les petits ruminants avec des risques d'entérostomie. Concernant le Walo, on assiste à la récolte du riz de la campagne contre saison chaude et les résidus sont valorisés par les animaux et les éleveurs en profite pour faire leur stock en paille. Également, les résidus issus des cultures de décrue sont toujours utilisés par le bétail. Abreuvement du bétail L'abreuvement du cheptel se fait principalement au niveau des forages puits pastoraux et au niveau du fleuve Sénégal et de ses défluent dans le Walo. Situation Zoosanitaire Durant la période du 23 au 29 juin 2025, dans le cadre du Système national de Surveillance épidémiologique des maladies animales et au titre de la surveillance passive, les quatorze (14) Directeurs régionaux de l'Elevage ont rapporté des suspicions de : botulisme asin, bovin, équin et ovin ; bronchite infectieuse aviaire et ovine ; charbon symptomatique bovin ; clavelée et variole caprine ; coccidiose bovine, ovine et aviaire ; coryza infectieux aviaire ; dermatose nodulaire contagieuse bovine ;	distomatose bovine, ovine et caprine ; ecthyma contagieux ovin et caprin ; entérotaxémie bovine et ovine ; fasciolose bovine ; fièvre aphteuse bovine et caprine ; gale sarcoptique ovine et équine ; gourmé équine et asine ; habronérose cutanée équine ; kérato-conjonctivite infectieuse ; lymphangite épizootique asine et équine ; maladie de Gumboro ; maladie de Marek ; maladie de Newcastle ; myiases bovine, caprine et ovine ; pasteurellose bovine, ovine et caprine ; péripneumonie contagieuse bovine ; peste des petits ruminants ; peste équine ; piroplasmose bovine ; pleuropneumonie ovine ; rage asine et canine ; salmonellose aviaire ; schistosomose ovine ; tétanos équin ; trypanosomose asine, bovine, équine et ovine ; variole aviaire et ovine. Pour contrôler les foyers de maladies, l'isolement, le traitement des malades, la saisie et la dénaturation d'organes impropres à la consommation humaine, la vaccination pérfocale et la sensibilisation des éleveurs ont été effectués. Au total, deux cent cinq (205) suspicions de foyers de maladies ont été rapportés. Les cinq (05) pathologies dominantes sont les suivantes : la pasteurellose bovine, ovine et caprine pour 43 foyers ; la clavelée et variole caprine pour 25 foyers ; la distomatose bovine, ovine et caprine pour 18 foyers ; la gourme équine et asine pour 17 foyers ;
---	--

Suivi de la végétation

Indice de Végétation (NDVI : *Normalized Difference Vegetation Index*)

A la troisième décade du mois de juin 2025, l'installation de la végétation se poursuit timidement sur l'ensemble du territoire national notamment dans la partie sud et sud-est du pays avec des valeurs du NDVI qui sont faibles à moyennes (Figures c) mais avec une nette amélioration par rapport aux deux décades précédentes (Figures a, b). Cependant, ces valeurs sont plus élevées que celles de l'année précédente à la même période (Figures d, e et f). Cette situation pourrait être expliquée par les cumuls pluviométriques reçus plutôt dans ces zones par rapport à la normal (ANACIM, 2025).



Figures : Cartes du NDVI de (a) la première décade, (b) la deuxième décade et (c) la troisième décade du mois de juin 2025 en comparaison avec les valeurs de l'année 2024 aux mêmes décades (d), (e) et (f), respectivement.

Recommandations

- L'ANACIM renforcera sa communication sur la dissémination des prévisions météorologiques (en perspectives des phases humides prévues durant la décade en cours) pour permettre aux producteurs de planifier les opérations de semis dans les zones Centre.
- La Direction de l'Elevage et ses services rattachées renforceront le Système national de Surveillance épidémiologique des maladies animales pour un meilleur suivi des maladies endémiques au cours de la saison des pluies.
- La DPGRPE continuera la surveillance accrue de l'évolution des cours d'eau depuis leurs affluents pour permettre d'alerter à temps quant à la survenue des crues.
- La Direction de l'Agriculture en partenariat avec l'INP continuera la sensibilisation des producteurs sur l'utilisation des produits (calcaire et phosphate) mis à leur disposition pour l'amendement des sols.
- Le GTP renforcera la communication avec les structures de presse membres du Groupe pour une meilleure compréhension des termes techniques utilisés dans le suivi agrométéorologique, ceci pour mieux porter le message auprès des populations locales.

Crée dans le cadre du Programme AGRHYMET, le GTP a pour objectif de contribuer à l'alerte précoce pour la sécurité alimentaire en fournissant des informations complètes sur la campagne agricole. Sa coordination technique est assurée par l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM). Le groupe composé des services intervenant dans le domaine de la production agricole [Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau, Direction de l'Agriculture, Direction de la Protection des Végétaux, Direction de l'Elevage, Centre de Suivi Ecologique, Commissariat à la Sécurité Alimentaire, Secrétariat Exécutif du Conseil National de la Sécurité Alimentaire, CONACILSS, Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques...] publie à la fin de chaque décade un Bulletin Agrométéorologique Décadaire destiné aux autorités nationales, aux bailleurs de fond et aux techniciens, à la presse etc. Dans le cadre de la mise en place du Cadre Mondial des services climatologiques, ce groupe a été élargi aux assurances agricoles, INP, CNCR, CONGAD, ANCAR, URAC, Direction Générale Santé, DPVE et à la presse...